



A mentősköztől hetente lekérdezett statisztikákból azt vettük észre, hogy az elmúlt hetekben megsokszorozódott a kullancscsípések száma, ezért **Dr. Nagy Leventét** látogattuk meg, hogy segítsen kiigazodni, miért van ez, és valóban minden kullancscsípéssel le kell-e támadnunk a sürgősségi osztályt. A családorvos nagyon szívesen mesélt nekünk, kiderült, cikksorozatot is írt a témáról.

A nyári szezon a kullancsok életciklusában az a periódus, amikor szaporodnak és táplálkoznak, illetve sokkal nagyobb a lehetőség arra, hogy találkozzunk az élősködőkkel, hiszen többen járunk ki a természetbe és általában hiányosabb öltözetben.

A kullancsok látása igen gyenge ezért hőérzékeléssel és szaglással tájékozódnak, így találják meg az emberi és állati bőrfelületet, ahol olyan zónát keresnek, ahol a legpuhább a bőr. Így jutnak el főként a hajlatokba. Általában négy-öt órájukba telik, míg találnak egy olyan véreret, ahonnan megszívhatják magukat. A kullancs szűrő-szívó szájszerve spirál alakú, amelyből a nyálán keresztül kiválaszt egy zsibbasztó anyagot, így nem érezzük a csípését.

A rovaroknak több típusa van, környezetünkön főleg a klasszikus kullancs elterjedt, de közülük nem mindegyik fertőzött, „éppen ezért **a kullancscsípés nem képez sürgősséget**, ez téves elképzelés” – mondta Dr. Nagy Levente, szerinte egyénileg kell megoldani a problémát, esetleg

a permanenciaközpontban vagy a családorvosnál.

Piros, piros, de meddig...

„A fertőzött kullancsok emésztőrendszerében léteznek a Borellia burgdorferi nevű kórokozók. A kullancs megszívja magát vérrel, és amikor ez megtörtént, akkor bizonyos részét visszaöklendezi, így történik a fertőzés” – magyarázta a háziorvos. **A kullancs tulajdonképpen két fő betegséget okoz**, az agyvelőgyulladást, és a vidékünkön gyakoribb Lyme-kórt (borrelózis).

Előbbi vírusos, ezért védőoltással megelőzhető, de vidékünkön ez nem gyakori, utóbbi bakteriális, tehát észre kell vennünk és kezeltetnünk, ez általában egy hónapos antibiotikum-kúrát jelent.

Dr. Nagy Levente nem tud kullancscsípés által okozott agyvelőgyulladásos esetről a környéken, de ez egy elég súlyos betegség, akár egy héten át tartó kómás állapotot is okozhat, és van egy bizonyos elhalálozási százaléka, viszont nyomtalanul szokott gyógyulni.



A Lyme-kór egy héttel a csípés után jelentkezik. **Ha egy héten belül a csípés helyén piros a bőrfelületünk, az csak egy irritáció is lehet**

, okozhatja az, hogy a kullancs szájszerve nem steril. Ha ez a helyi reakció elmúlik és utána jelenik meg a piros zóna, amelynek a közepe elhalványul és folyamatosan tágul, akkor van dolgunk ezzel a betegséggel. Mivel ez egy hatalmas kört is leírhat, jó megjegyeznünk a csípés pontos helyét.

A Lyme-kórt ezerarcú betegségnek is hívják, hiszen nagyon változatos, bármely szervet érintő tüneteket produkálhat. A problémát okozó spirál alakú baktérium évekig megbújhat az ember szervezetében, és több évvel a csípés után is okozhat akár egy idegbénulást, ízületi bántalmakat, szívizomgyulladást, vagy agyvelőgyulladást.

Ne bosszantsd fel a kullancsot!

A kullancs kiszedéséről is megkérdeztük Dr. Nagy Leventét, mert rengeteg népi módszerről hallottunk már korábban. **„Dörzsölgetni gyufafejjel, olajjal, zsírral, petróleummal szigorúan tilos**

, mert az egyébként nem jóllakott kullancsot, ha ezekkel mi bosszantjuk, kiváltjuk ezt a visszafele öklendezést. Ha egy olyan csipesszel próbálkozunk, ami a kullancs testét összenyomja, azzal mi magunk fecskendezzük a testéből a fertőzést a vérereinkbe.

A helyes kivetéshez **egy olyan csipesz kell, mint a szemöldökcsipesz, amellyel tulajdonképpen a kullancsot nem összenyomjuk, hanem a bőrfelülethez minél közelebb megpróbáljuk megfogni**

, egy pár mozdulatot teszünk vele, hogy a szúrcsatornát tágtítsuk és kitépjük" – magyarázta a helyes eljárást a családorvos.



[Intrajob Dr. Nagy Levente írásai](#)