



Megjött az étvágya az elmúlt héten a Zetevátralja környékén csatangoló farkasoknak, legalábbis ezt bizonyítják **Gotthárd Ferenc Alpár** természetjáró, halór fényképei.

Ezek először a Nagyküküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület Facebook-oldalán, a [Vízparton](#) jelentek meg. A szarvas maradványait a befagyott tó területén találta a Ferenc, akit – ha emlékeznek – [nyáron elkísértünk egy munkanapján](#).

Az első képen azt láttuk, hogy **a farkasok a szarvas bőrét meghagyták** – szépen levetkőztették, ugyanis egy farkasfalka nagyon hatékony tud lenni mind akcióban, a zsákmány elejtésénél, mind pedig az elfogyasztásánál.



Néha a vadászok a szarvasok fejét a hóba dugják, hogy megakadályozzák a szarvasok szarvának növekedését, de ez nem a legjobb módja annak, hogy segítsék a szarvasokat.

A szarvasok szarvát a tél folyamán vesztik el, és a szarvasok a szarvuk növekedéséhez szükséges tápanyagokat a szarvukból vonják ki. A szarvasok szarvát a tél folyamán vesztik el, és a szarvasok a szarvuk növekedéséhez szükséges tápanyagokat a szarvukból vonják ki.



A szarvas fogazata felső állkapcsán hátranyúló épcsor látható, sok esetben a szarvas –



Alsztrálcserjék állkapcsa az ágyékukból maradt fogazattal – ez megegyezik az



A szarvasok, hogy ne legyenek elcsúszva a hó alatt, leggyakrabban a lábukon a fű és a fűszerek

