




"Ez csaknem mindig az első kérdés, amit a migrénes páciensek feltesznek" - mondta **Christophe Tzourio**

, a párizsi

Pierre és Marie Curie Egyetem

kutatója, akinek tanulmánya a

British Medical Journal (BMJ)

című orvosi folyóiratban jelent meg. A migrén minden kilencedik felnőttet érint, okai még tisztázatlanok, de vélhetően valamiképpen az agyi erek játszanak szerepet az állapot kialakulásában.

Egy korábbi kutatásnál mágneses rezonanciás képalkotó eljárást (MRI) alkalmaztak migrénben szenvedő embereknél, és megállapították, hogy nagyobb valószínűséggel fordulnak elő agyukban a mikroegek sérülései. Az ilyen típusú léziók gyakoribbak az idősebbeknél, a cukorbetegyeknél és a magas vérnyomásban szenvedő embereknél. Nagy számban való előfordulásukat kapcsolatba hozták a depresszió, a szélütés nagyobb kockázatával, valamint olyan neurodegeneratív betegségekkel, mint az *Alzheimer-kór*.

Tzourio és kutatócsoportja több mint nyolcszáz, 65 év feletti nantes-i ember kognitív képességeit mérte fel. A vizsgálatba bevont önkéntesek mintegy 15 százaléka szenvedett migréntől valamikor életében.

A tesztek értékelésekor az derült ki, hogy nem volt kognitív károsodása még a migrén legsúlyosabb formájában szenvedő embereknek sem, nem mutatták a szellemi hanyatlásnak több jelét, mint a migrén nélkül élők.

Forrás: MTI